

PODSTAWOWE ZASADY PIELĘGNACJI ZIELENI

DRZEWA

***Tilia cordata* / lipa drobnolistna**

W pierwszych latach uprawy: regularne, umiarkowane podlewanie, szczególnie w czasie suszy (nadmiar wody w podłożu może prowadzić do rozwoju chorób grzybowych). Nawożenie drzewa – naturalnymi substancjami - zaleca się na początku wiosny. Przycinanie, jeśli konieczne, należy przeprowadzać wiosną.

***Acer pseudoplatanus* / klon jawor**

Wymagane jest regularne podlewanie; ściółkowanie skutecznie zapewnia odpowiednią wilgotność. Wskazane jest zasilanie organicznymi nawozami nasadzeń wykonanych na słabszych glebach. Cięcia należy zminimalizować, ograniczając się do cięcia fitosanitarnego oraz w przypadku nadmiernego rozrastania.

***Prunus serrulata* 'Kanzan' / wiśnia piłkowana 'Kanzan'**

Podlewanie należy wykonywać rzadziej, ale bardzo obficie. Podczas upalnych miesięcy drzewa podlewamy wcześniej rano albo wieczorem, ograniczając parowanie wody. Nawożenie organiczne: każdego roku w celu poprawienia jakości podłoża; od wczesnej wiosny do końca czerwca można stosować nawóz mineralny zasobny w azot, jesienią - nawóz fosforowo-potasowe. Przycinanie wykonać po zakończeniu pędzenia soków, tj. po wypuszczeniu pierwszych liści.

L.p.	Nazwa czynności	Krotność powtarzana
1	Pielenie	3 x w roku
2	Nawożenie	1 x w roku
3	Przycinanie koron w miarę potrzeb	1 x w roku
4	Ochrona przed chorobami i szkodnikami	wg potrzeb
5	Podlewanie	8 x w roku
6	Wymiana wiązałów i palików	wg potrzeb

KRZEWY

***Rosa rugosa* 'Moje Hammarberg' / róża pomarszczona 'Moje Hammarberg'**

Podlewanie wymagane jest po dokonanych nasadzeniach, następnie zaleca się umiarkowane podlewanie. Nawożenie wiosną - po wypuszczeniu pędów - nawozem wieloskładnikowym, wolno działającym. Dodatkowe nawożenie wskazane jest w przypadku rabat pokrytych warstwą ściółki z uwagi na zmniejszenie dostępności azotu dla róż. Przycinanie: skracanie pędów do zdrowej tkanki, odcinanie starych i cienkich pędów po okresie zimowym; następnie należy wykonać cięcie pielęgnacyjne i formujące w okresie letnim.

***Cornus alba* 'Kesselringii' / dereń biały 'Kesselringii'**

Rośliny należy regularnie podlewać, utrzymując wilgotne podłoże – w przypadku posadzenia w miejscach pozbawionych wilgotności podłoża. Nawożenie: sporadyczne, z zastosowaniem wieloskładnikowego nawozu o przedłużonym działaniu, kompostem lub ekologicznym biuhumusem. Przycinanie: wczesną wiosną, skracając pędy o 1/3 - 2/3 długości, do wysokości 15 cm.

***Ribes sanguineum* 'Atrorubens' / porzeczka krwista 'Atrorubens'**

Podczas suchych dni wymagane jest podlewanie, stosując duże jednorazowe dawki polewowe, unikając lania wody po liściach; młode krzewy należy nawadniać częściej niż dojrzałe. Nawożenie: wiosną nawozem wieloskładnikowym. Po sadzeniu zaleca się przycięcie wszystkich pędów młodego krzewu, następnie wykonanie cięć latem – po zakończeniu kwitnienia. Co parę lat należy wyciąć najstarsze gałęzie krzewu.

***Mahonia aquifolium* / mahonia pospolita**

Podlewanie jest konieczne latem i jesienią. Nawożenie: wskazane, preparat do roślin kwitnących. Zalecane ściółkowanie (kora np.) powierzchni pod krzewami. Regularne przycinania nie są wymagane, ale zaleca się wykonywać cięcia wiosną, po kwitnieniu.

***Syringa meyeri* 'Palibin' / lilak Meyera 'Palibin'**

Podlewanie w stopniu umiarkowanym (młode rośliny), podczas suszy rośliny starsze. Zaleca się używanie organicznych wieloskładnikowych nawozów do krzewów kwitnących – z fosforem i potasem oraz ściółkowanie podłoża. Przycinanie: po okresie kwitnienia.

***Spiraea japonica* 'Little Princess' / tawuła japońska 'Little Princess'**

Podlewanie regularne; nawożenie: preparatami o przedłużonym działaniu, kompost lub ekologiczny biohumus. Przycinanie wczesną wiosną przed rozpoczęciem okresu wegetacji. W okresie letnim zaleca się usuwanie przekwitłych kwiatostanów.

***Spiraea japonica* 'Dart's red' / tawuła japońska 'Dart's'**

Podlewanie regularne; nawożenie preparatami uniwersalnymi do roślin ogrodowych. Przycinanie przeprowadzać wczesną wiosną przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego. W okresie letnim wskazane jest usuwanie przekwitłych kwiatostanów.

***Spiraea x cinerea* 'Grefsheim' / tawuła szara 'Grefsheim'**

Podlewanie regularne; nie wymaga intensywnego nawożenia. Przycinanie po okresie kwitnienia.

***Weigela florida* 'Victoria' / krzewuszką cudowną 'Victoria'**

Młode krzewy wymagają regularnego podlewania, rośliny starsze - w razie potrzeby, w okresach suszy. W czasie upałów zaleca się obfite podlewanie. Jesienią wskazane jest zastosowanie kompostu, późną wiosną nawozu wieloskładnikowego; należy unikać silnego nawożenia. Przycinanie: co roku w okresie letnim po kwitnieniu należy skracać pędy kwitnące. Wczesną wiosną wskazane jest usuwanie przemarzniętych i/lub uszkodzonych pędów. Wskazane jest przeprowadzanie przycinania odmładzającego co parę lat – w okresie wiosennym.

***Hippophae rhamnoides* / rokitnik pospolity**

Po dokonanych nasadzeniach oraz w pierwszym roku podlewanie regularne. W latach późniejszych nie wymaga obfitego podlewania. Roślina nie wymaga nawożenia. Przycinanie krzewów jest wskazane, ale nie jest konieczne; zaleca się wykonywanie cięcia po zbiorze lub przycinanie wraz z owocami. „Prześwietlenie” krzewu można wykonywać w dowolnym okresie, z wyjątkiem mroźnych dni.

***Lavandula angustifolia* / lawenda wąskolistna**

Nie wymaga częstego podlewania. Nawożenie nie jest niezbędne; w przypadku konieczności zaleca się niewielkie ilości preparatów mineralnych wolno działających lub płynnych w niewielkim stężeniu

w okresie wiosennym; w okresie jesiennym kompost. Wymagane jest regularne przycinanie w okresie wiosennym, następnie po kwitnieniu.

***Lonicera nitida* / suchodrzew mirtolistny**

Regularne podlewanie nie jest konieczne. Nawożenie kompostem w okresie wiosennym. Wymagane jest regularne podcinanie, wykonując cięcia: skracające w okresie wiosennym, prześwietlające podczas zimy (styczeń – luty), formujące w dowolnym okresie, odmładzające po kwitnieniu.

***Euonymus fortunei* 'Coloratus' / trzmielina Fortune'a 'Coloratus'**

Wymagane jest podlewanie w okresach suszy, zwłaszcza latem; zalecane jest obfite podlanie jesienią, a następnie ściółkowanie grubą warstwą ściółki w celu utrzymania wilgoci w ziemi. Nawożenie raz w roku, wiosną (kompost lub uniwersalny nawóz mineralny); zaleca się podlewanie roślin rozcieńczonym biohumusem. Cięcie nie jest niezbędne, lecz zalecane w celu zagęszczenia rośliny.

***Pachysandra terminalis* 'Green Carpet' / runianka japońska 'Green carpet'**

Nie wymaga podlewania, nawożenia ani odchwaszczania.

***Cotoneaster dammeri* 'Major' / irga Dammera 'Major'**

Wymaga podlewania w okresie długotrwałej suszy. Zaleca się stosowanie nawozów bogatych w potas i azot. Przycinanie regularne, na wiosnę.

***Juniperus communis* 'Repanda' / jałowiec pospolity 'Repanda'**

Wymaga obfitego i regularnego podlewania w okresie wiosny i lata. Nawożenie preparatami do iglaków i tui. Przycinanie: cięcia sanitarne w okresie przedwiośnia, po zimie, podczas dodatnich temperatur.

***Pinus mugo* / sosna kosodrzewina**

Roślina odporna na suszę, praktycznie nie wymaga podlewania. Nawożenie wskazane jest po kilku latach od zasadzenia – w przypadku słabego wzrostu i/lub kwitnienia – oraz wiosenne raz do roku (po dwóch – trzech latach od zasadzenia); zalecane nawozy

wieloskładnikowe Przycinanie w okresie od marca do kwietnia, nie jest konieczne każdego roku (zaleca się raz na dwa – trzy lata).

Rosa 'The Fairy' / róża 'The Fairy'

Regularne podlewanie konieczne jest w pierwszym roku po posadzeniu; w latach kolejnych – podczas suszy. Zaleca się stosowanie nawozów organicznych, mineralnych lub o przedłużonym działaniu. Nawożenie preparatem mineralnym należy rozpocząć w drugim roku po posadzeniu, od połowy kwietnia; nawożenie wykonujemy co trzy – cztery tygodnie. Do ściółkowania zaleca się kompost. Przycinanie należy przeprowadzić w kwietniu, przed wytworzeniem nowych pędów. W okresie wegetacji należy usunąć zniszczone pędy oraz przekwitłe kwiatostany.

L.p.	Nazwa czynności	Krotność powtarzana
1	Podlewanie	8 x w roku
2	Ochrona przed chorobami i szkodnikami	wg potrzeb
3	Pielenie	4 x w roku
4	Ścinanie części naziemnych	wg potrzeb / 1 x w roku (przekwitłych)

BYLINY

***Geranium macrorrhizum* / bodziszek korzeniasty**

Regularne podlewanie nie jest wymagane. Zalecane jest nawożenie preparatami o przedłużonym działaniu, które stosuje się w okresie wegetacyjnym, kompostem lub ekologicznym biohumusem. Przycinanie: w okresie późnojesiennym; po okresie kwitnienia usuwanie przekwitłych kwiatostanów.

***Stachys byzantina* / czyściec wełnisty**

Podlewanie w okresach większej suszy, niezbyt często. Nie wymaga nawożenia. Przycinanie co kilka lat; regularne przycinanie kwiatostanów po okresie kwitnienia.

***Sedum 'Herbstfreude'* / rozchodnik 'Herbstfreude'**

Regularne podlewanie konieczne jest w pierwszym roku po posadzeniu. Nawożenie wskazane jest po upływie trzech – czterech lat od zasadzenia; preparatami mineralnymi

wieloskładnikowymi, kompostem, biohumusem, preparatami o przedłużonym działaniu, zawierającymi potas i magnez. Przycinanie wczesną wiosną.

***Dianthus deltoides* / goździk kropkowany**

Zaleca się regularne podlewanie w okresie suszy i wysokich temperatur oraz stosowanie saletry wapniowej oraz okrywanie w okresie niższych temperatur, aby uniknąć przemarznięcia. Nawożenie humusem lub kompostem. Po przekwitnięciu konieczne jest przycinanie oraz usuwanie kwiatostanów; regularne pielienie jest niezbędne.

L.p	Nazwa czynności	Krotność powtarzana
1	Zasilanie nawozami mineralnymi	2 x w sezonie
2	Podlewanie	8 x w roku
3	Ochrona przed chorobami i szkodnikami	wg potrzeb
4	Pielenie	4 x w roku
5	Ścinanie części naziemnych	wg potrzeb / 1 x w roku (przekwitłych)

LABIRYNT, TUNEL I FILTR ROŚLINNY

***Carpinus betulus* / grab pospolity**

Wymagane jest regularne podlewanie – szczególnie młodych sadzonek. Nawożenie w okresie wiosennym, po pojawieniu się przyrostów; zaleca się dojrzały kompost. Przycinanie dwa razy do roku: pod koniec czerwca oraz w połowie sierpnia lub lutego.

***Salix viminalis* / wierzba wiciowa**

Wymaga umiarkowanego podlewania, w okresie suszy - obfitego. Intensywne nawożenie preparatami mineralnymi. Przycinanie: po pierwszym roku od posadzenia usunięcie pędów w okresie zimowym. Regularne odchwaszczanie.

Łąka kwietna

Wymaga koszenia jeden raz do roku, następnie wygrabienia po dwóch – trzech tygodniach.

Trawniki

L.p.	Nazwa czynności	Krotność powtarzana
1	Pielenie	2 x w roku
2	Grabienie	2 x w roku
3	Nawożenie	1 x w roku
4	Koszenie trawy	1 x w sezonie / rok
5	Dosiewanie nasion traw	wg potrzeb

Stan roślinności winien być stale obserwowany. W przypadku pojawienia się nietypowych i/lub niepokojących objawów (na liściach, pędach, gruncie itp.) należy niezwłocznie zlecić prace wyspecjalizowanej firmie. Zaleca się, aby raz na miesiąc, dokonać przeglądu stanu roślinności przez osobę z odpowiednim wykształceniem kierunkowym np. architekt krajobrazu lub technik ogrodnictwa.